










МЦ Рязанский проспект. г. Москва ул. Михайлова 31А. М.Рязанский проспект.
М.Окская. М.Стахановская. 8(495)363-03-63

Осмотр терапевта перед вакцинацией	<i>Перед любым введением вакцины всем пациентам день в день необходимо пройти осмотр врача-терапевта или педиатра (лицам младше 18 лет) для выявления возможных противопоказаний. Приказ МЗ РФ 1122н 06.12.21 г.; СанПиН 3.3686-21 гл. XLVII.</i>		с 18 лет	990		
Вакцины	От каких заболеваний	Кому нужна прививка	Возрастной коридор	кол-во доз на курс	Цена 1 дозы	Подробная информация о вакцине bessudnov.com/vaksinaciya (наведи камеру смартфона)
Гардасил	ВПЧ 6,18,11,16 типов	Женщины и мужчины для профилактики заражения ВПЧ 6,18,11,16 типов	9-45 лет	3	12500	
Превенар-13	Пневмококковая инфекция	Всем не привитым ранее, особенно группы высокого риска пневмоний тяжелого течения.	с 2 мес	1	4000	
Регевак	Гепатит В	Всем не привитым ранее, особенно, чьи профессии связаны с повышенным риском заражения.	с 19 лет	3	700	
ЭнцеВир, Клещ-Э-Вак	Клещевой энцефалит	Всем выезжающим в зону риска по клещевому энцефалиту (эндемичные очаги). Высокая вероятность укуса клещей. Список всех регионов см. по ссылке>>	с 1 года	2	1890	
Альгавак	Гепатит А	Всем перед выездом в эндемичные страны и регионы. Список всех регионов см. по ссылке>>	с 3 лет	1	1790	
Вианвак	Брюшной тиф	Всем перед выездом в эндемичные страны и регионы. Список всех регионов см. по ссылке>>	с 3 лет	1	1450	
Шигеллвак	Дизентерия Зонне	Всем перед выездом в эндемичные страны и регионы. Список всех регионов см. по ссылке>>	с 3 лет	1	1290	
Вакцина желтой лихорадки	Вирус желтой лихорадки	Перед выездом в неблагополучные районы (Африка, Латинской Америки). Выдается международный сертификат. Список всех регионов см. по ссылке>>	с 9 мес	1	1500	

Менактра	Менингококк (А, С, Y и W-135)	При контакте с больными менингококковой инфекцией; Выезд в Африку ("менингитный пояс"). Саудовская Аравия в сезон Хаджа. Список всех регионов см. по ссылке>>	с 9 мес до 55 лет	1	5500	
Коревая вакцина	Корь	Всем не болевшим и не привитым ранее. Привитым однократно. Болевшим или привитым с уровнем IgG к вирусу кори менее 0,18 МЕ/мл . Экстренная профилактика контактными в первые 72 ч.	с 1 года	1	700	
Витагерпавак	Вакцинация от герпеса 1 и 2 типов	Пациентам с частыми рецидивами герпетической инфекции 1 и 2 типов	с 18 лет	5	1300	
Адасель	дифтерия, коклюш, столбняк	Ревакцинация взрослых 1 раз в 10 лет. Экстренная профилактика столбняка в первые 20 дней после возможного риска инфицирования.	4-64 года	1	2800	
Ротатек	Ротавирусная инфекция	Вакцинация детей раннего возраста. Введение через рот в виде суспензии 2 мл.	1,5-8 мес	3	4000	
Варилрикс	Ветряная оспа	Не болевшим и не привитым ранее. Не имеющие антител IgG к Varicella Zoster. Контактные лица, не болевшие ранее, в первые 96 часов.	с 9 месяцев	2	3890	

В один день можно комбинировать введение нескольких прививок в разные участки тела отдельными шприцами. Если вакцины вводятся не в один день, интервал между ними должен составлять не менее 1 месяца. Комбинация иммунобиологических препаратов осуществляется под контролем врача. После введения каждой дозы вакцины необходимо находиться в медицинском учреждении 30 мин для мониторинга возможных аллергических реакций.